

FOLIGAIN



Раствор миноксидила 2% для наружного применения.
1 мл. раствора содержит 20 мг. миноксидила.

Вспомогательные вещества: этанол, пропиленгликоль, вода очищенная.

- 3 флакона по 60 мл. каждый
- Пипетка в комплекте для точного дозирования
- Один флакон на 1 месяц применения

Показания.

Андрогенетическая алопеция у женщин с целью восстановления волосяного покрова или стабилизации процесса выпадения волос.

Способ применения.

- При помощи пипетки-дозатора нанести 1 мл. 2 раза в сутки / утро-вечер / на участки подверженные выпадению волос.
- Массажными движениями распределить и равномерно втереть в кожу головы. Не требует смывания.
- После процедуры вымыть руки с мылом.
- Использование большей дозы чем 2 мл. в день или увеличение частоты нанесений не улучшают результаты.
- Необходимо длительное использование FOLIGAIN 2, т.к. в случае отмены выпадение волос возобновится.
- В некоторых случаях возможно изменение цвета и / или текстуры волос.

Миноксидил FOLIGAIN 2 не следует использовать если:

- у Вас нет семейной предрасположенности к выпадению волос
- выпадение волос началось внезапно и / или если облысение носит очаговый характер
- выпадение волос связано с предшествующим периодом родов
- Вы наносите другие лекарственные средства на кожу головы

При появлении местных (покраснение / раздражение, шелушение и зуд в местах нанесения), или системных побочных эффектов (сердцебиение, снижение артериального давления, загрудинные боли, головокружение) использование миноксидила следует отменить и обратиться к врачу за консультацией.

- Миноксидил FOLIGAIN 2 не предотвращает выпадение волос, вызванное нарушением питания, например, дефицит железа или витамина А в организме, некоторыми лекарственными препаратами, а также выпадение волос в результате укладки в тугие прически.

Противопоказания.

- Детский и подростковый возраст до 18 лет, беременные и кормящие.
- Миноксидил не следует наносить при воспалении, инфицировании и нарушении целостности кожи в т.ч. при солнечном ожоге.

Предупреждения.

- Только для наружного применения. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу.
- В случае случайного попадания в глаза промойте большим количеством холодной проточной воды.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Огнеопасно. Хранить вдали от огня или пламени.

Производитель: Foligain®, 7702 East Doubletree Ranch Rd. Suite 300, #303 Scottsdale, AZ 85258 (США) <http://foligain.com>