



## FOLIGAIN 2% миноксидил.

Раствор миноксидила 2% для наружного применения.

1 мл. раствора содержит миноксидила 20 мг.

Вспомогательные вещества: этанол, пропиленгликоль, вода очищенная.

3 флакона по 60 мл. каждый. Пипетка в комплекте для точного дозирования.

Один флакон рассчитан на 1 месяц применения.

### **Показания.**

Андрогенетическая алопеция у женщин с целью восстановления волосяного покрова или стабилизации процесса выпадения волос.

### **Способ применения.**

- При помощи пипетки-дозатора нанести 1 мл. 2 раза в сутки \ утро-вечер \ на участки подверженные выпадению волос.
- Массажными движениями распределить и равномерно втереть в кожу головы. Не требует смывания.
- После процедуры вымыть руки с мылом.
- Использование большей дозы чем 2 мл. в день или увеличение частоты нанесений не улучшают результаты.
- Необходимо длительное использование FOLIGAIN 2, т.к. в случае отмены выпадение волос возобновится.
- В некоторых случаях возможно изменение цвета и / или текстуры волос.

### **Миноксидил FOLIGAIN 2 не следует использовать если:**

- у Вас нет семейной предрасположенности к выпадению волос.
- выпадение волос началось внезапно и / или если облысение носит очаговый характер.
- выпадение волос связано с предшествующим периодом родов.
- Вы наносите другие лекарственные средства на кожу головы.

При появлении местных ( покраснение / раздражение, шелушение и зуд в местах нанесения ), или системных побочных эффектов ( сердцебиение, снижение артериального давления, загрудинные боли, головокружение ) использование миноксидила следует отменить и обратиться к врачу за консультацией.

- Миноксидил FOLIGAIN 2 не предотвращает выпадение волос, вызванное нарушением питания, например, дефицит железа или витамина А в организме, некоторыми лекарственными препаратами, а также выпадение волос в результате укладки в тугие прически.

### **Противопоказания.**

Детский и подростковый возраст до 18 лет, беременные и кормящие.

Миноксидил не следует наносить при воспалении, инфицировании и нарушении целостности кожи в т.ч. при солнечном ожоге.

- Только для наружного применения. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу или в Токсикологический центр.
- Избегайте контакта с глазами. В случае случайного попадания, промойте глаза большим количеством холодной проточной воды.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Легковоспламеняющийся: хранить вдалеке от огня или пламени.

**Производитель:** Anagen Research, LLC. West Hollywood, CA 90069 (США) <http://foligain.com>