



Миноксидил Lipogaine Sensitive 5% / Липогейн 5% миноксидил для чувствительной кожи

Липогейн Lipogaine лосьон на основе 5% миноксидила с добавлением DHT блокатора AzetinoI™ и витаминов для укрепления и стимуляции роста волос при лечении андрогенетической алопеции у мужчин. Усиленная формула миноксидила для чувствительной кожи без пропиленгликоля.

Состав:

- Миноксидил 5%
- Азетинол \ AzetinoI™
- Экстракт Серенои ползучей \ Saw Palmetto \ Serenoa Repens extract
- Бета-ситостерол \ Beta-sitosterol
- Яблочный полифенол
- Биотин
- Ниацин
- Витамины B6 и B12
- Фосфатидилхолин

Вспомогательные вещества: этанол, глицерин, вода, α и γ липоевая кислота. Не содержит пропиленгликоль.

Азетинол \ AzenitoI™ DHT блокатор снижает активность 5 альфа редуктазы. При местном применении стимулирует рост волос за счет продления стадии анагена т.е. активного периода роста фолликула.

Бета-ситостерол \ β -sitosterol растительный стерин, имеющий наибольшее структурное сходство с холестерином. Растворим в спирте но не растворим в воде. Необходим для улучшения впитывания растворенных в спирте соединений в эпителиальные ткани из которых состоит кожа. При совместном применении с миноксидилом является для последнего проводником внутрь кожи.

Яблочный полифенол растительное фенольное соединение входящие в состав косметических средств для профилактики воспалительных реакций и сухости кожи.

Биотин \ витамин H \ витамин B7 \ кофермент R является основным источником серы в клетках, которая, в свою очередь, участвует в процессе синтеза белка – коллагена. Этим объясняется тот факт, что биотин входит в состав витаминов для укрепления волос: Специальное Драже Мерц, Перфектил, Компливит сияние и т.д.

Ниацин \ никотиновая кислота \ витамин PP \ витамин B3. При местном применении способствует регенерации тканей кожи, восстанавливает кровоснабжение волосяных луковиц. Ниацин необходим для профилактики дерматитов и себореи.

Витамины группы B6 и B12 улучшают циркуляцию крови подкожной клетчатке и участвуют в транспорте кислорода к волосяному фолликулу.

Фосфатидилхолин \ лецитин фосфолипид содержащий холин. Входит в состав мембран клеток, выполняет метаболические и структурные функции. В косметологии используется как средство доставки активных компонентов в глубокие слои кожи.

Способ применения.

- Наносить **1 мл.** раствора миноксидила **2 раза в день** на участки выпадения / поредения волос.
- Втереть массажными движениями кончиками пальцев в кожу головы.
- После процедуры вымыть руки с мылом.
- Использование большей дозы или увеличение частоты применения не улучшают результаты
- Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос и поддержания достигнутых результатов
- Первые результаты могут появиться после 2х месяцев использования миноксидила 5% Lipogaine Sensitive

Предупреждения.

- Только для наружного применения. Не наносите на другие участки тела.
- В случае случайного контакта, промойте глаза большим количеством холодной проточной воды.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не использовать во время беременности или при кормлении грудью.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Огнеопасно! Беречь от огня или пламени.

Особые указания.

- Кроме наследственной предрасположенности выпадение волос может быть вызвано и другими причинами. Миноксидил не предотвращает выпадение волос, вызванное некоторыми лекарственными препаратами, нарушением питания (дефицит железа или витамина А в организме), а также выпадение волос в результате укладки в тугие прически.
- Пациент должен быть предупрежден о необходимости проконсультироваться с врачом в случаях, если выпадение волос началось внезапно, или если облысение носит очаговый характер, также если у пациента имеется патология со стороны сердечно-сосудистой системы.
- При появлении системных побочных эффектов (загрудинные боли, сердцебиение, головокружение, снижение артериального давления, внезапное увеличение массы тела, отеки рук и/или ног), а также покраснения и раздражения в местах нанесения миноксидила, препарат следует отменить и при необходимости назначить соответствующую терапию.
- В период применения можно использовать средства для ухода за волосами (в т.ч. лак для волос). При этом сначала следует нанести миноксидил и дать обработанному участку кожи полностью высохнуть, а потом применять средства для ухода. По имеющимся в настоящее время данным окраска волос, выполнение химической завивки или использование кондиционеров не снижают эффективность миноксидила при условии, что препарат полностью смывает с волос и кожи волосистой части головы перед проведением этих процедур.

Противопоказания.

- Детский и подростковый возраст до 18 лет.
- Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.
- Препарат не следует наносить при покраснении, воспалении, инфицировании, болезненности кожи головы (в т.ч. при солнечном ожоге).

Производитель:

Lipogaine, Boston, MA (США)

Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя: <http://lipogaine.com>

