

#1 DERMATOLOGIST RECOMMENDED BRAND

Rogaine®

Rogaine® - актуальное, клинически доказанное и одобренное FDA / U.S. Food and Drug Administration решение при выпадении волос у женщин.

Rogaine® - бренд № 1 рекомендованный дерматологами при андрогенетической алопеции.



Активный компонент: Мinoxидил 2% / Minoxidil 2% активирует фолликулы для стимуляции роста волос.

Мinoxидил обеспечивает комплексное влияние на фолликулы:

- улучшает питание волос за счёт сосудорасширяющего эффекта
- нейтрализует влияние ДГТ / DHT / дигидротестостерона
- снижает чувствительность фолликулов к ДГТ
- влияет на смену фаз жизненного цикла волос: переход из фаз деградации и покоя в фазу роста

Rogaine® останавливает выпадение волос и обладает стимулирующим действием на фолликулы у женщин с андрогенетической алопецией т.е. облысением по мужскому типу.

- Наряду с действием миноксидила следует устранить причину выпадения волос: приём определенных лекарственных средств, облучения, гормональные нарушения, нервный стресс, дефицит железа, витамина А и т.д. Признаки роста волос появляются через 2-4 месяца применения. Начало и выраженность эффекта от миноксидила у разных людей могут отличаться.

Вспомогательные вещества: спирт, пропиленгликоль, очищенная вода.

Показания к применению лосьона Women's Rogaine®:

- Выпадение волос у женщин с андрогенетической алопецией.
- Выпадение волос высокой интенсивности или диффузное выпадение волос в результате гормональных нарушений, например, в результате заболевания щитовидной железы, после родов, прекращения или начала приема гормональных противозачаточных средств.
- Выпадение волос высокой интенсивности или диффузное выпадение волос в результате нервных стрессов, длительного приема антибиотиков, нейролептиков, антидепрессантов и других лекарств, хирургических операций, острых инфекционных и тяжелых хронических заболеваний, а также диет с недостатком жизненно важных для организма витаминов и компонентов.

Способ применения:

- Наносить **1 мл.** при помощи капельницы (входит в комплект) **2 раза в день** на кожу головы в области выпадения волос.
- Необходимо постоянное использование для улучшения состояния и поддержания роста волос.
- Возможно усиление выпадения волос в начале применения, что является первым признаком действия миноксидила. Такое временное явление наблюдается через 2-4 недели после начала применения и постепенно прекращается.
- В некоторых случаях после применения миноксидила наблюдается изменение цвета и текстуры волос.

Противопоказания:

- Период беременности и лактации.
- Возраст до 18 лет.
- Не рекомендуется наносить лосьон на раздраженные участки кожи / покраснение, воспаление, инфицирование, солнечный ожог и т.д.

Предупреждения:

- Только для наружного применения.
- При проглатывании следует обратиться за медицинской помощью.
- При случайном попадании в глаза смыть проточной водой.
- Огнеопасно! Хранить вдали от открытого огня или пламени.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Возможны появления местных побочных эффектов в виде покраснения, раздражения, перхоти или зуда в местах нанесения миноксидила.
- В случае появления системных побочных эффектов: загрудинная боль, сердцебиение, головокружение, снижение артериального давления, внезапное увеличение массы тела, отеки рук и / или ног следует прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу.

Производитель:

Johnson & Johnson Healthcare
Division of McNEIL-PPC, Inc. Skillman, NJ 08558 USA
Active Made in Italy

Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя

Women's Rogaine® 2% Minoxidil Topical Solution: <http://www.womensrogaine.com>